Vertissements

PUBLICATION PERIODIQUE ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F. C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège. (rédigé en collaboration avec la Ferme de Loudes et les G.V.A.)

Nº 10 DU 23 JUIN 1988

TOURNESOL - PHOMOPSIS

TRATTEZ

MAIS - SESAMIE - PYRALE

TOURNESOL :

Le suivi des pièges à ascospores indique toujours une grande activité du phomopsis, les projections d'ascospores ont été très importantes au cours de la dernière période; les pics maximum ont été enregistres du 10 au 20 JUIN.

LE DANGER est toujours présent, TRAITEZ ou RENOUVELEZ le traitement. La maladie s'observe dans de très nombreuses situations, et une proportion. importante de périthèces est encore susceptible de produire des ascospores (agents de contamination)

Traitez tous les tournesols: (voir notre avertissement N° 9 du 8 JUIN 1988)

MINISTERE DE L'AGRICULTURE SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal 34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



. . . / . . .

- FELTAR Flo..... 7 L/Ha
- 2° l Traitement par voie aérienne, impératif, si vous ne pouvez plus réaliser l'application vous même :

- PELTAR..... 7 L / Ha
3 L d'huile
5 L d'eau

Si vous devez renouveler la protection de vos mais pour la Sésamie (vol encore important).

Utilisez une des solutions suivantes assurant la couverture du risque Pyrale:

- DECIS C.E..... 0,8 L/Ha
- FACTAC..... 0,6 L/Ha
- KARATE.... 0,4 L/Ha

经证据的证据的现在分词